Generico	Producto	Laboratorio	Tª Conservación	Preservar Luz	Observaciones	Congelación	Fuente Información
Acetato de flecainida 150 mg.	Apocard 150 mg 10 mg/ml ampolla	3M España	Tº entre 5ºC - 30ºC No congelar.	n/c	n/c	n/c	Prospecto
Acido Acetilsalicílico	A.A.S. 300 mg comprimido	Bayer	n/c		Conservar en envase original		Vdemecum Internacional
Acido Aminocaproico	Caproamin Fides	RotaPharm SL	n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Acido Valproico 400 mg	Depakine inyectable	Sanofi-Synthelabo	Temperatura ambiente. Las soluciones para perfusión 2 y 8ºC /24 horas antes de su uso.	n/c	n/c	n/c	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Adenosina 6 mg	Adenocor 6 mg/2 ml ampolla	Sanofi-Synthelabo	No precisa conservación frigorifico	n/c	No utilizar contenido vial ya empezado.	n/c	Prospecto
Amiodarona 150 mg/ 3 mg ampolla	Trangorex 150 mg/ 3 mg ampolla	Sanofi Aventis	No conservar a temperatura superior 25ºC	Si		n/c	Ficha técnica AGEMED
Atenolol	Tenormin 5 mg/ 10 ml ampolla	AstraZeneca	No conservar a temperatura superior 30ºC	Preservar en el envase original para preservar de la luz.	n/c	n/c	
Atropina sulfato 1mg.	Atropina Sulfato 1 mg/ 1 ml ampolla	Laboratorios Serra Pamies SA	n/c	n/c	No requiere condiciones especiales de conservación . Desechar soluciones sobrenates una vez abierto el envase.	n/c	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Biperideno Lactato 5 mg.	Akinetón 5 mg/ 1 ml ampolla		n/c				
Bromuro de ipratropio monohidrato	Atrovent monodosis 500 mcg sol.inh.	Boehringer Ingelheim España	No requiere condiciones especiales de conservación	n/c	n/c	n/c	Ficha técnica AGEMED
Bromuro de Roncuronio	Esmeron 50 mg/5 ml	Organon Española	2ºC - 8ºC Nevera	Si	12 Semanas 8ºC- 30ªC		Datos laboratorio. Prospecto
Budesónida	Pulmicort 0,50 mg/ml suspensión para inhalación por nebulizador	AstraZeneca	No conservar a temperatura superior 30ºC	Tras abrir el sobre de aluminio, las ampollas unidosis no utilizadas deberan de mantenerse en el sobre para protegferlas de la luz.	Utilizar las ampollas unidosis en un plazo de 3 meses tras la apertura del sobre.Utilizar el contenido de la ampolla en un plazo de 12 horas tras su apertura.Conservar en posición vertical, protegido de la luz.. Desechar en contenedor SIGRE.	No congelar	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Captopril	Capoten -25 25 mg comprimido	Squibb industria farmacéutica	No conservar a temperatura superior 30ºC	n/c	Conservar en envase original. Mantener el envase perfectamente cerrado para preservarlo de la humedad.	n/c	Ficha técnica AGEMED
Carbón Activado 50 gr frasco	Carbón Activado 50 gr frasco	LAINCO SA	n/c	n/c	Una vez preparada la suspensión administrar inmediatamente o conservar en nevera (4-8ºC) < 72h.		

Clopidogrel	Plavix 75 mg comprimidos cubierta pelicular	Sanofi-Synthelabo	n/c		Conservar en envase original	n/c	Prospecto, Ficha técnica EMEA
Cloracepato dipotasico 50 mg	Tranxilium 50 mg vial	Sanofi Aventis	No conservar a temperatura superior 30ºC	Si	Preservar de la humedad		Ficha técnica AGEMED
Clorhexidina	Cristalmina spray	Laboratorio Salvat	No conservar a temperatura superior a 30ºC,		Con el calor se descompone en cloroanilina		Ficha Seguridad Paciente EPES
Cloruro Calcico 10% 1g/10 ml :13,5 mEq	Cloruro Calcico 10% 1g/10 ml :13,5 mEq		n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Dexclorfeniramina	Polaramine ampolla	Schering-Plough	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto
Diazapam 10 mg /2 ml ampolla	Valium 10 mg /2 ml ampolla	ROCHE FARMA	No conservar a temperatura superior 30ºC	n/c	Conservar en el embalaje exterior	n/c	Ficha técnica AGEMED
Diazepam 10 mg comprimido	Valium 10 mg comprimido	ROCHE FARMA	Ninguna especial	n/c	n/c	n/c	Ficha técnica AGEMED
Diazepam 5 mg microenema	Stesolid 5 mg microenema	Faes Farma	No conservar a temperatura superior 30ºC	n/c	n/c	n/c	Ficha técnica AGEMED
Digoxina 0,25 mg/1 mg ampolla	Digoxina 0,25 mg/1 mg ampolla		n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Dobutamina 250 mg/20 ml ampolla	Dobutamina Inibsa 250 mg EFG	INIBSA	No conservar a temperatura superior 30ºC	si	n/c	n/c	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Dolantina 100 mg/ 2 ml ampolla	Dolantina 100 mg/ 2 ml ampolla	Kern Pharma	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecton/d Ficha técnica AGEMED
Dopamina	Dopamina 200mg/ 5 ml ó 10 ml ampolla	Grifols	Tª Ambiente	Si	n/c	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Enoxaparina	Clexane 100 mg/1 ml Jeringa	Aventis	No conservar a temperatura superior 25ºC	n/c	n/c	n/c	Prospecto
Epinefrina 1 mg.	Adrenalina Braun 1 mg/ 1ml ampolla	Braun	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto, N/d Ficha técnica AGEMED
Etomidato	Etomidato 20 mg/10 ml	B.Braun Melsungen	n/c		Mantener el envase en el embalaje exterior.No contiene conservantes. Las fracciones no utilizadas deben desecharse.	No congelar	Ficha técnica AGEMED
Fenitoina	Fenitoina 250 mg/ 5 mg vial	Laboratorios Rubió	n/c		Condiciones normales de conservación. Solo deberán de utilizarse soluciones libres de turbideces y precipitados.		Ficha técnica AGEMED
Fentanilo	Fentanest 0,15 mg/ 3 ml ampolla	Kern Pharma		Si			Prospecto n/d Ficha técnica AGEMED
Flumazenilo	Anexate 0.5 mg/ 5 ml	Roche	No conservar a temperatura superior 30ºC	n/c	Permanecer en la ampolla justo antes de su uso. Desechar despues de cargada en jeringa o diluida a las 24 horas	n/c	Ficha técnica AGEMED
Flumazenilo	Flumazenilo Combino Pharm 0,1 mg/1 ml ampolla	Combino Pharm	No conservar a temperatura superior 30ºC	n/c	n/c	n/c	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Furosemida	Seguril 20mg/ 2 ml ampolla	Aventis	n/c	Si	n/c	n/c	Prospecto

Glucagon 1mg	Glucagon-gen hypokit 1 mg	Novo Nordisk Pharma	2ºC-8ºC Nevera	Si	El envase sellado debe protegerse de la luz y almacenarse en nevera (2ºC-8ºC).Dentro del periodo de validez puede conservarse a temperatura ambiente 18 meses (25ºC). Evitar la Congelación.Si el producto reconstituido presenta una formación fibrilar de aspecto viscoso o materia insoluble se tiene que desechar. Una vez reconstituido debe de adminstrase inmediatamente.	No congelar	Prospecto, ficha técnica AGEMED
Glucosmón R50 10 g/20 ml ampolla	Glucosmón R50 10 g/20 ml ampolla	ALTANA Pharma S,A.	n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Haloperidol	Haloperidol 5 mg/1 ml ampolla	Dr.Esteve	Tª Ambiente,fresco y seco	n/c	n/c	n/c	Prospecto
Heparina Sódica 5000UI/5 ml vial	Heparina Sódica 5000UI/5 ml vial	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A:	n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Hidrocortisona Sodio Fosfato 100 mg.	Actocortina 100 mg ampolla	Altana Pharma	Conservar entre 15ºC - 30ºC		Reconstituido: 24 horas 2ºC-8ºC		n/d Ficha técnica AGEMED
Insulina humana ,ADNr	Insulina rápida 100 UI/ 10 ml vial* Actrapid 100 UI/ml vial 10ml	Novo Nordisk Pharma	2ºC - 8ºC Nevera	Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.	Envases intactos: 24 horas máximo entre 9-25 ºC Vial en uso: Durante su utilizacuión no refrigerar.No conservar a Tª superior a los 30ºC.No deben de utilizarse los preparados de insulina que se hayan congelado.No utilizar si la solución no es clara e incolora.	No Congelar. No deben de utilizarse los preparados de insulina que se hayan congelado.	Prospecto . Datos laboratorio, Ficha técnica EMEA
Ketamina	Ketolar 50 mg/ ml vial 10 ml	Parke-Davis Grupo Pfizer	n/c	Si	Puede variar su color de incoloro a muy lijeramente amarillento y puede oscurecer al exponerse mucho tiempo a la luz. No afecta a la potencia . No usar si presenta precipitado.	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Labetalol	Trandate 100 mg/20 ml ampolla	Kern Pharma	n/c	Si	n/c	n/c	Prospecto
Lincaina 5% 10 ml ampolla	Lincaina 5% 10 ml ampolla	Braun	n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Diltiazem 25 mg ampolla	Masdil 25 mg ampolla	Laboratorios Dr.Esteve SA	n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Metamizol magnesico	Nolotil 2g/ 5 ml ampolla	Boehringer Ingelheim España	No requiere condiciones especiales de conservación		No requiere condiciones especiales de conservación.		Ficha técnica AGEMED
Metamizol magnesico	Lasain 2g/ 5 ml ampolla	Laboratorios Inibsa.SA	No requiere condiciones especiales de conservación		No requiere condiciones especiales de conservación.		Ficha técnica AGEMED
Metilergobasina	Methergin 0'2 mg	Novartis	2ºC - 8ºC Nevera	Proteger de la luz	Periodos cortos de tiempo (menos de dos semanas) a temperatura inferior a 25 ºC.		Datos laboratorio, Ficha técnica AGEMED
Metilprednisolona	Urbason 40 mg ampolla	Aventis Pharma SA	n/c	Si	n/c	n/c	Prospecto n/d Ficha técnica AGEMED

Metilprednisolona	Solu-Moderin 1 gr. Vial	Pharmacia	n/c	n/c	Preparar la solución del vial con el diluyente que incluye el envase.	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Metoclopramida	Primperan 10 mg/ 2 ml ampolla	Sanofi-Synthelabo	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto
Midazolam 15 mg/3 ml	Dormicum 15 mg/ 3 ml ampolla	ROCHE FARMA			Puede estallar al congelarse. Puede formarse un precipitado que se disuelve a temperatura ambiente.Las disoluciones son estables 24 horas a temperatura ambiente y 3 dias a 2-8ºC	No congelar	Ficha técnica AGEMED
Morfina Hidrocloruro	Cloruro Mórfico 20 mg/1 ml ampolla	Laboratorios Serra Pamies	No conservar a temperatura superior 25ºC	n/c	Las ampollas abiertas y no utilizadas deben desecharse.	n/c	Ficha técnica AGEMED
Naloxona	Naloxone 0,4mg/1 ml ampolla	Abello	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Neostigmina 0,55 mg/ 1 ml	Neostigmina 0,55 mg/ 1 ml		n/c	Proteger de la luz	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Nitroglicerina	Solinitrina 0,80 mg comprimido	Almirall Prodesfarma	Sitio fresco y seco. No Nevera		Conservar en envase original. Puede limitarse su acción a 3 - 6 meses, si no se guarda en su alveolo original y se lleva cerca del cuerpo al afectarle el calor corporal.		Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Nitroglicerina	Solinitrina 5mg/ 5 ml ampolla	Almirall Prodesfarma	No requiere condiciones especiales de conservación	n/c		n/c	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Omeprazol	Omeprazol 40 mg/ 10 ml vial	GES Alfa Wassermann	No conservar a temperatura superior 25ºC	Si	Reconstituido: 24 horas 2ºC-8ºC 8 horas a 25ºC		Prospecto
Peroxido de Hidrogeno	Agua Oxigenada 10 volum.1 litro frasco		n/c	n/c	n/c	n/c	n/d Ficha técnica AGEMED
Piridoxina -Vitamina B6	Benadón 300 mg/2 ml ampolla	Roche	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto, N/d Ficha técnica AGEMED
Propafenona Clorhidrato	Rytmonorm 70 mg ampolla	ABBOTT	>15ºC	n/c		n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Propofol	Propofol 1% Fresenius	Fresenius Kabi	No conservar a temperatura superior 25ºC	n/c		No congelar	Prospecto
Propofol	Recofol 10 mg/ml 20 ml ampolla	Schering España SA	n/c	n/c	Máximas medidas de asepsia. Administrarse despues de abrir la ampolla y administrarse sin demora. Desechar cualquier solución restante.	No congelar	Prospecto, Ficha técnica AGEMED
Ranitidina 50 mg/ 5 ml	Ranitidina 50 mg/ 5 ml	Glaxo Smithkline	No conservar a temperatura superior 25ºC	Si			Ficha técnica AGEMED
Salbutamol	Ventolín 0,5% solución	Aldo-Union	Sitio fresco	si	n/c	n/c	Prospecto
Salbutanol	Ventolín 500mcg/1 ml ampolla	Glaxo Smithkline	n/c	Si	n/c	n/c	Prospecto
Scandicain 2% 10 ml	Scandinibisa 2% 10 ml	Inibsa	Proteger del calor	Si	n/c		Laboratorio en pagina Web
Sulfato de Protamina	Protamina ampollas	Rovi	< 10ºC Nevera		Máximo 48 horas hasta 20ºC - 25ºC	Desechar	Prospecto
Sulfato Isoprenalina	Aleudrina 0,2 mg/2 ml ampolla*	Boehringer Ingelheim España	2ºC - 8ºC Nevera		Se reduce la caducidad 3 meses a Tº <25ºC. Máximo 6 meses a temperatura ambiente.	no datos	Datos laboratorio vía telefónica. Prospecto
Sulmetin Simple 10 ml ampolla	Sulmetin Simple 10 ml ampolla	Sanofi Aventis					n/d Ficha técnica AGEMED

Sulperide	Dogmatil 100 mg/ 2 ml ampolla	Sanofi-Synthelabo	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto, ficha técnica AGEMED
Suxametonio	Anectine 100 mg/ 2 ml ampolla*	Glaxo Smithkline	2ºC - 8ºC Nevera		14 días Tº <25ºC. Se permiten periodos cortos de tiempo, como por ejemplo para su transporte.	no datos	American Hospital Formulary, Drug Information® 2002. American Society of Health-System Pharmacists. Succinilcholine Chloride, 2002; 1334-9. Ficha técnica.
Teofilina IV 200 mg/ 10 ml ampolla	Eufilina venosa/ 10 ml ampolla	Altana Pharma	n/c	n/c	Conservar envase original	n/c	Ficha técnica AGEMED
Tenecteplasa	Metalyse	Boehringer Ingelheim International GmbH	No conservar a temperatura superior 30ºC	Si	Conservar en envase original para preserrvar de la luz. Una vez reconstituido puede conservarse 24 h. a 30ºC		Ficha técnica laboratorio
Tiamina - Vitamina B1	Benerva 100 mg/1 ml ampolla	Bayer	Tº < 25ºC/30ºC	n/c	n/c	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Toradol 20 mg/1 ml ampolla	Toradol 20 mg/1 ml ampolla						
Toxoide Tetánico	Toxoide tetánico* Anatoxal TE Berna 40 UI amp 0,5 ml	Berna Biotech España	2ºC - 8ºC Nevera		Hasta 25 ºC: 24 horas como amp 0,5 ml máximo: sin restricciones de uso. Más de 24 horas y hasta 72 horas como máximo: reducir el tiempo de caducidad en dos meses. Más de 72 horas y hasta 120 horas: reducir el tiempo de caducidad en cuatro meses. Más de 25 y hasta 37 ºC: máximo 24 horas y reducir el tiempo de caducidad en tres meses. En cualquier otro caso, destruir el producto.	Desechar	Datos laboratorio
Uradipil 50mg/10 ml	Elgadil 50mg/10 ml	Altana Pharma	No conservar a temperatura superior 30ºC	n/c	Cnservar el envase en el embalaje exterior	n/c	Ficha técnica AGEMED
Sueroterapia							
Cloruro Sódico 900mg/100ml	Viaflo Cloruro Sódico 0.9% 100 ml	Baxter Medital	No requiere condiciones especiales de conservación	n/c	No sacar la unidad de la sobrebolsa hasta que esté lista para su uso.La bolsa interior manteiene la esterilidad del producto	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Cloruro Sódico 900mg/100ml	Viaflo Cloruro Sódico 0.9% 250 ml	Baxter Medital	No requiere condiciones especiales de conservación	n/c	No sacar la unidad de la sobrebolsa hasta que esté lista para su uso.La bolsa interior manteiene la esterilidad del producto	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Cloruro Sódico 900mg/100ml	Viaflo Cloruro Sódico 0.9% 500 ml	Baxter Medital	No conservar a temperatura superior 25ºC	n/c	No sacar la unidad de la sobrebolsa hasta que esté lista para su uso.La bolsa interior manteiene la esterilidad del producto	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Glucosa 5 gr/100 ml	Suero Glucosa 5% 100 ml MEIN	Fresenius Kabi	n/c	n/c	No usar si no es transparente y sin precipitados	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED

	Suero Glucosa 5% 250 ml						Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Cloruro Sódico 900mg/100ml	Suero Lavado	B.Braun Medical SA	No conservar a temperatura superior 25ºC	n/c	Desecahar el remanente una vez abierto	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Hidroxietil almidón (130/0.4)	Voluven 6%	Fresenius Kabi France	n/c	n/c	Utilizar inmediatamente despues de que la bolsa sea abierta. Cualquier resto de solución sin utilizar debe desecharse adecuadamente.	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Manitol 20	Osmofundina Concentrada Manitol 20 250 ml	B. BRAUN Medical	n/c	n/c	E caso que aparezcan cristales, calentar en baño maria a lo 50ºC agitando suavemente hasta la total disolución. Dejar enfreiar e infundir si la solución es perfectamente clara y sin sedimento.	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED
Bicarbonato Sódico 21gr/250 ml	Suero Bicarbonato 1 M 250 ml	Fresenius Kabi	n/c	n/c	n/c	n/c	Prospecto, n/d Ficha técnica AGEMED